Test batteri Team for medicinnedtrapning	Afklarende (1) (BASELINE)	Afklarende (2) (BASELINE)	Indledende (OPSTART MEDICINNEDTRAPNING)	Månedligt	Hver 14. dag	Afsluttet nedtrapning	Opfølgende (Jf. Månedligt + Afsluttet efter 6 mdr)
Motivations-vurdering	X						
CR: Positive and negative symptom scale (PANSS-6: 15 min, PANSS-30: 45 min)		PANSS-30	PANSS-6	PANSS-30	PANSS-6	PANSS-30	
CR: Clinical Global Impression (CGI) (2 min)		CGI-S		CGI-I		CGI-I	
CR: Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS) (15 min)			X	X		X	
CR: Screen for Cognitive Impairment in Psychiatry (SCIP) (15 min)			X			X	
CR: Early Sign Scale (ESS) (10 min)	X			X	X	X	
CR: Functional Assessment Short Test (FAST (10 min.)		X		X		X	
CR: UKU Bivirkningsskala (15 min)	X			X		X	
SR: Aarhus Side effect Assessment Questionnaire (ASAQ) (5 min)	X			X		X	
SR: Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) (10 min)	X			X		X	
SR: Bech's Cognitive Insight Scale (BCIS) (10 min)	X			X		X	
SR: Self-evaluation of Negative Symptoms (SNS) (5 min)	X			X		X	
SR: Auditory Vocal Hallucination Rating Scale – Questionnaire (AVHRS-Q) (5 min)	X			X		X	
SR: Alcohol/Drug Use Disorder Identification Test (AUDIT/DUDIT) (20 min)	X			X		X	
SR: Recovery Assessment Scale (RAS) (5 min)	X			X		X	
SR: WHO-5 Well-being Index (2 min)	X			X		X	
V-Risk	X					X	
Suicidalitetsscreening	X			X		X	
Behandlingsplan	X		X				
Blodprøver			X (før samtale)	X		X	